



Klerat[®] 0,005BB

Rodenticide

syngenta[®]

Rodentisida

Rodentisida antikoagulan, berupa umpan siap pakai berbentuk blok segiempat, berwarna hijau kebiru biruan, untuk mengendalikan tikus sawah *Rattus argentiventer* dan tikus semak *Rattus tiomanicus*.

Bahan aktif: brodifakum 0,005%

**Nomor Pendaftaran:
RI. 0112011984666**

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN
PESTISIDA INI**

**SIMPANLAH DI TEMPAT YANG AMAN JAUH
DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

Berat Bersih:

1 kg



PERHATIAN



®

PERINGATAN BAHAYA

Berbahaya bila tertelan. Berbahaya terhadap hewan piaraan, ternak dan binatang buruan. Jangan memakan daging ternak dan binatang buruan yang terkena racun ini atau memberikan kepada hewan piaraan sebagai makanannya.

PETUNJUK KEAMANAN

Pada waktu bekerja dengan produk ini, membuka wadah, memindahkan dan memasang umpan jangan makan, minum atau merokok serta pakailah sarung tangan karet. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena produk ini, dengan air dan sabun. Cuci dan bersihkan semua peralatan yang telah digunakan. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, diluar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan produk ini atau wadah bekasnya. Rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN

Punggung terasa nyeri, perut sakit dan mual, lesu, kesadaran menurun, pendarahan pada hidung, gusi, bagian belakang selaput perut dan saluran pencernaan serta kejang-kejang pada perut dan ginjal. Air seni dan kotoran mengandung darah. Bengkak dan memar pada persendian lutut, sikut dan pantat. Terlihat bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Lebih lanjut terjadi gejala kurang darah. Apabila salah satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Tanggalkan pakaian yang terkena produk ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.

- Apabila produk ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit.
- Apabila terhirup, bawa penderita ke udara terbuka.
- Apabila produk ini tertelan berikan sejumlah Norit (*medicinal charcoal*) dan air minum. Jangan berikan apapun melalui mulut apabila penderita dalam keadaan tidak sadar. **Jangan dirangsang untuk muntah.** Bawalah penderita ke dokter terdekat secepatnya dengan menunjukkan label produk ini.

PERAWATAN OLEH DOKTER

Penderita yang mengalami keracunan rodentisida ini dapat diberikan antidot Vitamin K1 (phytomenadione BP) dengan dosis sebagai berikut:

- Anak-anak : 20 mg Vitamin K1 tiap hari dibagi dalam beberapa kali pemberian.
- Dewasa : 40 mg Vitamin K1 tiap hari dibagi dalam beberapa kali pemberian.

Pemberian antidot harus dibawah pengawasan dokter, diberikan melalui mulut atau suntikan (I.M atau I.V) secara perlahan-lahan. Dianjurkan untuk mengamati terus-menerus prothrombin dan tingkat haemoglobin pada darah penderita. Penderita harus selalu dalam pengawasan dokter sampai prothrombinnya normal kembali atau pendarahan berhenti sama sekali. Periksa segera golongan darah penderita di laboratorium dan sediakan darah untuk transfusi jika terjadi pendarahan yang berat atau terus-menerus.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Sasaran	Dosis dan Cara Pengumpanan
Tikus Sawah <i>Rattus argentiventer</i> Tikus Semak <i>Rattus tiomanicus</i>	Letakkan 1-2 buah umpan pada jalur/jalan tikus atau di depan lubang aktif, dengan dosis 0,4-0,8 kg umpan jadi/ha atau 100-200 buah umpan/ha

Waktu Pengumpanan
Pengumpanan untuk tikus sawah sebaiknya dilakukan saat bera hingga menjelang bunting. Pada saat bera pengumpanan dilakukan apabila ditemukan tanda-tanda kehadiran tikus (jejak, jalan tikus, kotoran, liang tikus) dan berdasarkan sensus populasi yaitu apabila >20% umpan sensus dimakan. Pada saat belum ada pertanaman, sensus dilakukan dengan memasang 5 titik umpan per ha. Ulangan pengumpanan dilakukan dengan interval 7-10 hari sampai serangan tikus terhenti. Pengumpanan dihentikan apabila padi sudah bunting.

Pemegang Nomor Pendaftaran:

PT SYNGENTA INDONESIA

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B. Simatupang No.2

Jakarta 12560 Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

TELP. DARURAT 021-573 5175



Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON
adalah merek dagang Syngenta Group Company