



Actellic[®]300CS

Long lasting residual insecticide

syngenta[®]

Insektisida

GRUP 1B INSEKTISIDA

Pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia, racun kontak dan pernapasan yang berspektrum luas, berbentuk kapsul yang dapat disuspensikan, berwarna kecoklatan, untuk mengendalikan nyamuk *Anopheles aconitus* di dalam ruangan.

Nomor pendaftaran: RI. 06090120165593

Bahan aktif: pirimifos metil 300 g/l

TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH PERORANGAN, HANYA OLEH PEST CONTROL/ PENYEMPROT PROFESIONAL

**BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI
SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK**

Isi Bersih: **833 ml**



PERINGATAN BAHAYA

Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan dan atau terhirup.

PETUNJUK KEAMANAN

Pada waktu bekerja dengan produk ini, membuka wadah, memindahkan dan mencampur, jangan makan, minum atau merokok serta pakailah sarung tangan karet, pelindung wajah dan pakaian berlengan panjang, celana panjang, sepatu boot karet dan penutup. Sebelum penyemprotan pindahkan makanan, hewan peliharaan dan furnitur. Apabila furnitur tidak bisa dipindahkan, maka harus ditutup dengan baik, termasuk lantai di bawah. Selama penyemprotan, tinggalkan rumah, dilarang masuk ke area penyemprotan selama 1 jam sampai dengan kering. Jangan menyemprot melawan angin. Setelah penyemprotan, material yang digunakan untuk menutup furnitur harus dibuang di tempatnya. Bersihkan (sapu atau pel) lantai setelah penyemprotan dengan pengawasan oleh pengawas penyemprot terlatih atau pemilik rumah. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena produk ini, dengan air dan sabun. Cuci dan bersihkan semua peralatan dan pakaian pelindung yang telah digunakan. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, diluar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan produk ini atau wadah bekasnya. Bilas 3 kali wadah kosong dan gunakan air bilasan untuk membuat campuran berikutnya. Rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN

Perut mual, muntah-muntah, kepala pening, gelisah, dada merasa sesak, susah bernapas, miosis, pandangan kabur, lesu, mencret, kram pada otot-otot, banyak berkeringat, daya reflek berkurang, banyak mengeluarkan cairan ludah, lebih lanjut penderita dapat pingsan. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Tanggalkan pakaian yang terkena produk ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila produk ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Apabila terhirup, bawa penderita ke udara terbuka. Apabila produk ini tertelan berikan sejumlah Norit (*medicinal charcoal*) dan air minum. Jangan berikan apapun melalui mulut apabila penderita dalam keadaan tidak sadar. **Jangan dirangsang untuk muntah.** Bawalah penderita ke dokter terdekat secepatnya dengan menunjukkan label produk ini.

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Berikan perawatan sesuai dengan gejala yang muncul. Suntikkan 2 mg Atropin Sulfat secara I.V. atau I.M. Ulangi penyuntikan setiap 20 – 30 menit sampai terlihat gejala keracunan ringan oleh Atropin yaitu muka merah, tachicardia mencapai 140/menit, sekresi kelenjar eksokrin dihambat dan midriasis. Sesudah Atropin dapat juga diberikan Pralidoxime (2 PAM) dalam waktu 48 jam sebanyak 1 gram untuk dewasa, 0,25 g untuk anak-anak secara I.V. perlahan-lahan dengan kecepatan 300 mg/menit. Setelah 30 menit dapat diulangi bila kelumpuhan belum teratasi. Jangan sekali-kali diberi obat penenang. Pada keracunan ringan, cukup diberikan 1 – 2 mg Atropin dengan interval pemberian maksimum 25 – 30 mg per hari secara I.V.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Gunakan Air sebagai Pelarut pada Waktu Aplikasi

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan	Cara Aplikasi
Nyamuk <i>Anopheles aconitus</i>	83.3 ml produk/l air, diaplikasikan 40 ml/m ²	Penyemprotan residual di dalam ruangan sampai dengan 24 minggu

Pemegang Nomor Pendaftaran: **PT Syngenta Indonesia**

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B.Simatupang No. 2

Jakarta 12560, Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

TELP. DARURAT 021-573 5175

Nama produk ditandai ® atau ™, ALIANSI FRAME
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON
adalah merek dagang Syngenta Group Company

